

Puntos clave para la detección, registro y manejo de la MASTITIS CLÍNICA

Usted debe buscar asistencia del veterinario o la veterinaria encargados de la salud de ubre del rodeo. En conjunto se diseñará y se dejará constancia por escrito de los protocolos y rutinas de trabajo. Esto le dará tranquilidad a todas las partes: no estamos solos y nos apoyamos unos en los otros.

1. Despunte

Observar cuidadosamente: la mayoría de las veces, las alteraciones en la leche serán lo único que mostrará una vaca con mastitis clínica. No obstante no olvidar el sistema de clasificación de severidad y su importancia.

Leve: leche anormal sin otros síntomas.

Moderada: leche anormal con inflamación a nivel de cuartos o ubre.

Severa: cualquiera de los síntomas anteriores y la vaca enferma.

2. Registros: consistentes, prácticos y confiables

Información necesaria:

- fecha del diagnóstico.
- número de identificación de la vaca.
- cuarto o cuartos afectados.
- severidad del caso.
- tratamiento incluyendo fecha de inicio, fin y alta (leche al tanque); los protocolos de tratamiento se elaboran con el veterinario encargado.
- firma o iniciales del operario que generó el registro.

3. Muestras para bacteriología

Acuerde con el veterinario la estrategia de muestreo de mastitis y siga estrictamente el protocolo de muestreo para bacteriología

4. Manejo de la vaca con mastitis

Vacas que se detectan con mastitis clínica deben ser identificadas y ordeñadas al final o con un órgano aparte para evitar la contaminación de las pezoneras. Su leche debe ser desviada (tarro o lote de enfermas) durante todo el tratamiento y tiempo de espera según lo expresa el prospecto del producto.

Tratamiento: revisar y seguir el protocolo escrito de tratamiento

Despunte en fondo negro



Observar atentamente: las alteraciones en la leche pueden ser lo único que mostrará una vaca con mastitis clínica. Tener en cuenta el sistema de clasificación de severidad y importancia.

Identificación de vacas con mastitis



5. Dar de alta

Una vez transcurrido todo el tratamiento que incluye el tiempo de espera del antibiótico utilizado, la vaca puede ser evaluada para dar de alta.

El dar de alta consiste en observar mediante el despunte la leche del/los cuarto/s afectado/s buscando la persistencia de algún signo o síntoma persistente.

Si la leche está normal (no presenta cambios visuales como coágulos, agua-chenta, cambios en su coloración) al terminar el tiempo de espera, la vaca se puede dar el alta y su leche vuelve al tanque.

EQUIPO TÉCNICO

Dr. Joaquín Barca

Dra. Mette Bouman

Dra. Elena de Torres

Dr. Martín Pol

COORDINACIÓN TÉCNICA

Dr. Juan Manuel Ramos Rama

Área Producción de leche / UTEC

Mg. Martín Pérez Burger

Acreditación de Saberes y

Certificación de Competencias