

EVALUAR PEZONES

después del ordeño: ¿máquina, ordeñador, virus o clima?

Congestión (punta del pezón roja o morada y dura)

Causas

- Pulsador no masajea
- Vacío muy alto
- Sobreordeño
- Edema de ubre

Consecuencia: el esfínter no puede cerrar rápido. El cuarto corre riesgo de infectarse.

Tomar acción: si es mayor al 20%.

Anillo palpable en la base del pezón

Causas

- Pezoneras anchas
- Pezoneras vencidas
- Vacío alto
- Sobreordeño

Consecuencia: puede llegar a grietas en la base del pezón (ver "grietas en la base del pezón").

Tomar acción: si es mayor al 20%

Grietas en la base del pezón

Causas: las mismas causas que el anillo, agravado por un clima frío, barro y un sellado deficiente.

Consecuencia: las grietas son colonizadas por bacterias causantes de mastitis. El cuarto corre riesgo de infectarse.

Tomar acción: si es mayor al 2% en invierno, 0% en verano.

Punta chata

Causas

- Pulsador con una fase de descanso muy larga.
- Tipo de máquina de ordeño: al terminar el ordeño, la pezonera se cierra pero no se retira.

Consecuencia: en general, no tiene consecuencias, salvo en condiciones climáticas de barro y frío cuando se pueden formar grietas en la punta del pezón.

Tomar acción: si es mayor al 20% .



Congestión



Anillo en la base del pezón



Grietas en la base del pezón

Hiperqueratosis (“flor” en la punta)

Causas

- Sobreordeño
- Vacas lentas de ordeñar (duras, mucha leche)
- Pezones puntiagudos
- Vacío alto
- Piel seca por condiciones climáticas

Consecuencia: las lesiones son colonizadas por bacterias causantes de mastitis. El cuarto corre riesgo de infectarse.

Tomar acción: si es mayor al 5%.

Grietas en el cuerpo del pezón

Causas

- Condiciones climáticas de barro y frío
- Lavado del pezón
- Químicos
- Pezoneras ásperas
- Sellado deficiente.

Consecuencia: las grietas son colonizadas por bacterias causantes de mastitis. El cuarto corre riesgo de infectarse. Las grietas son puerta de entrada para infecciones virales de la piel.

Tomar acción: si es mayor al 5%.

Pseudo-viruela (virus)

Causas

- Piel seca y agrietada (ver: grietas en el cuerpo del pezón).
- Otras vacas infectadas con el virus.

Consecuencia: las lesiones son colonizadas por bacterias causantes de mastitis. El cuarto corre riesgo de infectarse.

Tomar acción: si es mayor al 2%.

Verrugas (virus)

Causas

- Piel seca y agrietada (ver: grietas en el cuerpo del pezón).
- Otras vacas infectadas con el virus.

Consecuencia: según la ubicación puede dificultar el ordeño de un cuarto. Las lesiones son colonizadas por bacterias causantes de mastitis. El cuarto corre riesgo de infectarse.

Tomar acción: si es mayor al 2%.



Hiperqueratosis



Grietas en el cuerpo del pezón



Pseudo-viruela



Verrugas

EQUIPO TÉCNICO

Dra. Mette Bouman
Dr. Joaquín Barca
Dra. Elena de Torres
Dr. Martín Pol

COORDINACIÓN

Dr. Juan Manuel Ramos Rama
Área Producción de leche / UTEC
Mg. Martín Pérez Burger
Acreditación de Saberes y
Certificación de Competencias